

## GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK

### PREKINITEV NOSEČNOSTI Z MIFEPRISTONOM (MIFEGYNE) IN MISOPROSTOLOM (CYTOTEC)

#### OBVEŠČEN PRISTANEK

Spoštovani,

Prišli sta na prekinitev nosečnosti zaradi zdravstvenih razlogov. Nosečnost bomo prekinili z zdravili mifepriston (Mifegyne) in misoprostol (Cytotec).

**Prvi del prekinitve** nosečnosti bo potekal doma, le izjemoma vas bomo sprejeli v bolnišnico. Doma boste zaužila eno tableto mifepristona, ki jo boste dobili na ginekološkem oddelku. Do splava lahko v redkih primerih pride že po 1 tableti mifepristona to je v času, ko boste še doma. Če pričnete krvaveti ali začutite bolečine v spodnjem delu trebuha se nemudoma oglasite na pregled v bolnišnico. V primeru, da splavite doma, plod in tkivo, ki se je izločilo iz maternice, prinesite s seboj.

**Drugi del prekinitve** nosečnosti bo potekal v bolnišnici. Za sprejem v bolnišnico se oglasite 36 do 48 ur po zaužitju tablete mifepristona. Na oddelku vam bomo v nožnico vstavili 4 tablete misoprostola. Čez tri ure boste prejeli še 2 tableti misoprostola, za kateri vas prosimo, da ju 20 minut zadržite v ustih v prostoru med zobmi in licem preden jih pogoltnete. Po dve tableti misoprostola boste prejeli na tri ure do splava oziroma največ štirikrat. Če v treh urah po zadnjih dveh zaužitih tabletah misoprostola ne pride do splava, postopek v celoti ponovimo.

**Splav** napovedujejo krči z bolečinami v spodnjem delu trebuha in krvavitve. Večina žensk splavi v sedmih urah po vstavitvi 4-ih tablet misoprostola v nožnico. V 36 urah jih splavi 99 %. Maternica s svojim krčenjem, ki jih izzovejo zdravila, večinoma iztisne celotno vsebino (plod, placento in ovoje). Po splavu bomo opravili ultrazvočni pregled maternice, da preverimo ali se je nosečnost izločila v celoti. V 10% se vsebina maternice ne izloči v celoti. V takih primerih je potrebno maternično votlino izprazniti s kirurškimi inštrumenti v splošni narkozi (abrazija).

Zdravila, ki jih boste dobili sprožijo krče, pojavijo se bolečine v trebuhu, lahko se pojavi driska (v 14 - 40 %). Pri nekaterih nosečnicah se lahko zaradi zdravil pojavijo slabost, zaprtje, bruhanje, občutek napihnjenosti, izpuščaj po koži. Drugi neželeni učinki so zelo redki.

**Zdravilo je treba uporabljati skrajno previdno, če imate eno od naslednjih bolezni: astma, aritmija, slabo delovanje ledvic ali jeter, alergija na zdravilo, sum na izvenmaternično nosečnost, porfirija, huda hipertenzija, srčne bolezni, Raynaudov fenomen, Crohnova bolezen, alergija na mifepriston ali prostaglandine.**

Podpisana(ime in priimek) \_\_\_\_\_ potrjujem, da mi je zdravnik (ime in priimek) \_\_\_\_\_ razložil postopek prekinitve nosečnosti z mifepristonom in misoprostolom. Imela sem možnost vprašati vse, kar me je zanimalo in sem na svoja vprašanja prejela zadovoljive odgovore. S podpisom potrjujem, da se s postopkom strinjam.

Podpis nosečnice: \_\_\_\_\_

Podpis zdravnika: \_\_\_\_\_

Podpis priče (med. sestra): \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_